



## 彰化基督教醫療財團法人 鹿港基督教醫院

### 糞便培養檢體採集須知

1. 糞便拭子：準備一乾淨及乾燥的容器，將糞便直接排入容器中後，以嗜氧拭子沾取含黏液、血液、或膿之糞便。
2. 未使用嗜氧拭子採檢的新鮮糞便檢體，可放入50 mL無菌試管，室溫下2小時送檢。
3. 儲存條件
  - (1)使用嗜氧拭子傳送：2-8°C下24小時送檢
  - (2)新鮮糞便(未使用嗜氧拭子)：採檢後須於室溫下2小時送檢

檢驗課（地下室一樓）

週一至週五：早上七點至晚間十點/週六：早上七點至下午一點

電話：04-7779595 轉分機7074~6

表單編號：FW-54680-衛-08

實施日期：2017-04-01

版本：2017-01



## 彰化基督教醫療財團法人 鹿港基督教醫院

### 糞便培養檢體採集須知

1. 糞便拭子：準備一乾淨及乾燥的容器，將糞便直接排入容器中後，以嗜氧拭子沾取含黏液、血液、或膿之糞便。
2. 未使用嗜氧拭子採檢的新鮮糞便檢體，可放入50 mL無菌試管，室溫下2小時送檢。
3. 儲存條件
  - (1)使用嗜氧拭子傳送：2-8°C下24小時送檢
  - (2)新鮮糞便(未使用嗜氧拭子)：採檢後須於室溫下2小時送檢

檢驗課（地下室一樓）

週一至週五：早上七點至晚間十點/週六：早上七點至下午一點

電話：04-7779595 轉分機7074~6

表單編號：FW-54680-衛-08

實施日期：2017-04-01

版本：2017-01