




# 彰化基督教醫院醫療財團法人鹿港基督教醫院

## 糞便檢驗檢體採集注意事項

### 一般糞便檢驗檢體

1. 本採檢須知適用於採集糞便執行糞便潛血(化學法)檢驗、糞便白血球(pus cell)、Fetal Hb test (APT test)、中性脂肪酸(Neutral fat)、及糞便還原糖檢驗(stool reducing substance)。
2. 採集前注意事項
  - (1) 持檢驗單至檢驗室領取採便管。
  - (2) 執行潛血(化學法)檢驗時，應於前三天禁食肉類及含動物血食物，並禁服鐵劑及維生素 C。
  - (3) 執行中性脂肪酸(Neutral fat)檢驗時，不適合採集禁食狀態下的糞便送檢。
3. 糞便採集注意事項
  - (1) 應排便於乾淨的容器，不得混有尿液、消毒水或污水，以免影響檢測結果。
  - (2) 依容器上所附之說明，採取含有黏液、膿血等外觀異常部分的糞便。
  - (3) 外觀無異常的糞便須於糞便之表面及深處部位處取檢體，採取量約花生米大小。
  - (4) 腹瀉時可向檢驗室索取滴管及可密封之試管，將糞便解入便盆後，以滴管吸取便盆中約5 c.c.的糞便，裝入試管送檢。
4. 採集後注意事項
  - (1) 檢體採檢後須送至檢驗室之送檢時限分別如下：
    - (a) 糞便潛血(化學法)檢驗：採檢後24小時內送達。
    - (b) 糞便白血球(pus cell)、Fetal Hb test (APT test)：採檢後8小時內送達。
    - (c) 中性脂肪酸(Neutral fat)：採檢後4小時內送達。
    - (d) 糞便還原糖檢驗(stool reducing substance)：採檢後30分鐘內送達。
  - (2) 若醫師指示須連續留3天糞便檢體檢測潛血檢驗時，請將糞便以夾鏈袋密封後放置於冰箱冷藏，待第3天檢體留完後再一起送至檢驗室。

### 免疫法糞便潛血檢體



檢驗課(地下室一樓)服務時間:

週一至週五: 早上七點至晚間十點/週六: 早上七點至下午一點

電話: 04-7779595 轉分機7074~6